
Implantace Leadless Pacemakeru

Kvapilová V.

☐ Červen 2016

☐ 10 pacientů



Micra Cardiacapsule



Micra
Delivery Catheter



Micra Introducer

Příprava před výkonem

- Informovaný souhlas s výkonem
- Odběry
- Lačný
- Doppler

Ošetřovatelská péče na sále

- ❑ Lokální anestezie 1% Mesocainem
- ❑ Analgosedace – Fentanyl a Midazolam
- ❑ Napojení pacienta na VF, zajištění i.v. přístupu
- ❑ Zajištění proplachů FR s Heparinem, FR 1000 ml – 10 000 j do zavádějícího katetru a FR 500 ml – 5000 j do sheathu.
- ❑ Ukončení výkonu stehem femorálního přístupu a 10 min. kompresí a následnou zátěží s pískem

Ošetrovatelská péče po výkonu

- Zátěž s pískem 4 hodiny
- Klidový režim 12 hodin
- U pacientů s antikoagulační léčbou 24 hodin
- Ex. steh 24 hodin po výkonu

Výhody Leadless PM

- ❑ Vylučuje rizika klasických kardiostimulátorů – infekce kapsy, hemotorax, pneumotorax, dislokace a perforace elektrod
- ❑ Pohybový a estetický komfort pro pacienta

Děkuji za pozornost

