

Protrahovaná péče o dekubit na KCH JIP

Talašová K.

Kaláb M.

Karchiochirurgická klinika FN Olomouc a LF UPOL

Kazuistika

- ▶ 30.1.2018 po KCH operaci - CABG
- ▶ Pooperační komplikace:
 - Dehiscence sternotomie
 - Ruptura komory
 - Krvácení
 - Respirační insuficience
 - Porucha pasáže GIT
 - Psychosyndrom
 - Exantém DKK + břicha

Dekubit

- ▶ Analgosedace, katecholaminy
- ▶ Imobilizace, pouze laterální náklony
- ▶ 13.2.2018 první známky proleženin v oblasti sakra a hýždě- 1. stupeň, v rozsahu 2x2 cm a 5x8 cm → **Inadine + Suprasorb F**
- ▶ Rychlá progrese stavu dekubitu během 1 týdne na stupeň 3

- ▶ Změna terapie - **Aquacel Ag** + ster.krytí
- ▶ Polohování, hýždě podkládány nafukovacím kruhem, převazy d.p.
- ▶ Spodina dekubitu v oblasti hýždě nekrotizuje, okolí zarudlé, velikost 7x5x0,5 cm → oplach **Prontosanem** + **Nugel** + **Yelonet** + **ster.krytí** + do okolí **Cavilon** sprej
- ▶ Sakrální dekubit - postupné hojení

- ▶ 28.2. (14 dnů od vzniku dekubitu) první chirurgická nekrektomie a stěr na K+C, nález *Pseudomonas aeruginosa* +++ → oplach 0,5 % **Amikacin** + **Sorbalgon** + ster.krytí
- ▶ Velikost 8x6x2-2,5 cm, převaz 1x za 24hodin, popř. d.p., okolí macerované (stolice)
- ▶ Další nekrektomie v intervalech cca 3dnů
- ▶ ATB terapie 10 dní, dále **Prontosan** + **Sorbalgon** + sterilní krytí, do okolí **Hemagel**
- ▶ Spodina stále z části nekrotická, změna terapie → **Nugel** + **Aquacel Ag**

- ▶ 22.3. nekrektomie na operačním sále+ naložen **V.A.C** systém
- ▶ 8.4. ukončení **V.A.C** terapie→ **Prontosan** + obložky **Betadine**
- ▶ Stagnace dekubitu, spodina červená povleklá, velikost 7x5x2,5-3 cm, okolí klidné
- ▶ Mírná exsudace

V.A.C



dekubitus



Healer gel



Healer gel

- ▶ Produkt, doplněk , trombocytární lyzát biologického původu
- ▶ Obsahuje tzv. calf blood extract- výtažky z krevních destiček (růstové faktory a signální proteiny) izolované od krevní plazmy.
- ▶ Silné biostimulační účinky, vysoký hojivý potenciál izolovaných glykoproteinů (růstových faktorů)→ reparace poškozené tkáně a silné regenerační účinky
- ▶ Spektrum využití: drobná poranění, popáleniny, čerstvé jizvy, prasklinky, lupenka, problematicky se hojící rány kosmetické (akné, omlazení)

- ▶ 18.4. první aplikace **Healer gel + Cellistrypt + Prontosan**
- ▶ První týden převaz 1x 24 hodin, poté cca 1x 2- 3 dny za asistence chirurga
- ▶ Rána secernující, výměna sekundárního krytí d.p.
- ▶ Po cca 10 dnech spodina dekubitu granulující, okraje hladké, minimální exsudace, aplikace Healer gelu opět 1x denně
- ▶ V následujících dnech zjevný progres, cca po 1 měsíci zmenšení dekubitu na 5x4x2 cm

dekubitus



závěr

- ▶ Nadále pokračujeme v zavedené terapii Healer gelem se slibně se vyvíjejícím hojením hlubokého dekubitu, spolu s celkově zvýšenou ošetrovatelskou péčí.
- ▶ 18.6. překládáme pacienta do spádové nemocnice, kde dle získaných informací po 20 dnech zemřel.

Děkuji za pozornost

